



در صورت وجود نشانه‌های زیر فوری با اورژانس (125) تماس بگیرید:

- تنگی نفس و یا وجود مشکلات تنفسی
- کبودی لبها
- تب همراه با سردرد و سفتی گردن
- تب بالای 39 درجه‌ی سانتیگراد
- وجود تشنج
- گیجی، تغییرات غیرعادی در رفتار و گفتار
- بروز ناگهانی راش (بثورات پوستی)

1- تب را اندازه‌گیری نمایید.

اندازه‌گیری تب می‌تواند از راه دهانی، معقدی و یا زیربغل انجام شود.

تب به معنای دمای بدن بالای 37/8 درجه‌ی سانتیگراد از راه دهانی و بالای 38/2 از راه معقدی است. اندازه‌گیری دمای بدن از طریق قرار دادن دماسنج در زیربغل؛ روش دقیقی نیست و می‌تواند کمتر از دمای اندازه‌گیری شده از طریق قرار دادن دماسنج در دهان باشد.

دمای زیر 38 درجه‌ی سانتیگراد، تب خفیف در نظر گرفته می‌شود و بدان معناست که بدن نسبت به عفونت واکنش نشان داده است.

2- در صورت نیاز، تب را درمان نمایید.

درمان تب خفیف لازم نیست مگر اینکه فرد ناراحت باشد. درمان تب در صورتی که دمای بدن 38/8 یا بالاتر باشد، لازم است.

از داروهای تب‌بری که بدون نسخه هستند (مانند استامینوفن، ایبوپروفن و غیره) استفاده کنید و میزان دوز مورد نیاز را از راهنمای دارویی (بروشوی داخل جعبه‌ی دارو) بخوانید یا از دکتر داروساز پرسید. توجه: به افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان آسپرین ندهید، مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.

استفاده از پارچه‌ی خیس شده با آب ولرم و انجام پاشویه می‌تواند تب را کاهش دهد. از آب خنک و یا الکل برای این کار استفاده ننمایید.

فرد تب‌دار باید لباس‌های سبک بپوشد و رواندازش نیز سبک باشد. لباس زیاد می‌تواند دمای بدن را بالا ببرد. در صورت بروز لرز، از پتو برای گرم شدن فرد استفاده کنید؛ تا وقتی که لرز برطرف شود.

3- نوشیدن مایعات

فرد تب‌دار باید به میزان کافی مایعات بنوشد تا مایعات بدنش تأمین شود.

4- چه زمانی باید با پزشک تماس بگیرید؟

در صورت وجود هر یک از موارد زیر، فوری با پزشک تماس بگیرید:

- وجود سابقه‌ای از بیماری‌های جدی مانند ایدز، بیماری قلبی، سرطان، دیابت و یا مصرف داروهای تضعیف‌کننده‌ی سیستم ایمنی

- تب بالایی که به مصرف داروهای تب‌بر جواب نمی‌دهد.

- تب در فردی که در معرض هوای بسیار گرم بوده و رغم احساس گرمی، تعریق ندارد.

- وجود سفتی گردن، گیجی یا خواب‌آلودگی به شکلی که بیدار ماندن برای فرد مشکل باشد.

- وجود درد شدید در قسمت تحتانی شکم

- وجود درد شدید شکمی، استفراغ یا اسهال شدید

- بروز بثورات پوستی، تاول، دانه‌ها یا خطوط قرمز رنگ در پوست بدن یا اندامها

- گلودرد شدید، تورم شدید گلو یا گوش درد

- درد هنگام تخلیهی ادرار، یا همراه با کمر درد یا لرز شدید
- سرفه‌های شدید، دفع خون هنگام سرفه یا وجود اشکال در تنفس

5- پیگیری
در صورت ادامه‌ی تب برای بیش از سه روز، حتماً با پزشک تماس بگیرید.